



Broj: 885/11

Datum: 30. 01. 2026. god.

STRATEGIJA PRIMENE PESTICIDA JP „VOJVODINAŠUME“

Integralna zaštita šuma predstavlja skup svih raspoloživih mera koje imaju za cilj održavanje populacije štetnih bioloških agenasa na nivou na kome oni nisu ekonomski štetni. Drugim rečima, integralna zaštita šuma je optimalna kombinacija hemijskih, bioloških, biotehničkih i agrotehničkih mera, kao i mera uzgoja biljaka pri čemu se upotreba hemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničava na najnužniju dozvoljenu količinu potrebnu za zadržavanje populacije štetnih organizama ispod granice koja prouzrokuje privredno neprihvatljivu štetu ili gubitak. Dakle, integralna zaštita šuma ne podrazumeva potpuno isključenje pesticida iz upotrebe, već njihovu racionalnu primenu koja za rezultat ima povećanje profitabilnosti u šumarstvu.

Pristupanjem procesu sertifikacije šuma, JP „Vojvodinašume“ je u obavezi da primenu pesticida vrši u skladu sa načelima, principima i kriterijumima FSC politike o primeni pesticida (FSC-POL-30-001 и FSC-POL-30-001a V1-1).

Kratkoročni cilj FSC politike pesticida je smanjenje upotreba pesticida i izostavljanje najopasnijih, odnosno najštetnijih pesticida u sertifikovanim šumama u korist alternativnih metoda koje će biti efikasne, a manje štetne za okolinu. Dugoročni cilj ove politike je sukcesivno ukidanje upotrebe pesticida u FSC sertifikovanim šumama.

FSC politika pesticida razmatra ne samo opasnost od aktivnih materija, već i pod kojim okolnostima će pesticidi biti korišćeni, identifikuje najbolji pristup za smanjenje upotrebe pesticida kao i prevenciju, minimizaciju i ublažavanje povezanih ekoloških i socijalnih uticaja.

FSC politika pesticida sadrži tri liste visoko opasnih pesticida (HHPs):

1. **FSC Prohibited HHPs:** pesticidi zabranjeni u svakom slučaju (lista od 48 aktivnih materija);
2. **FSC Highly Restricted HHPs:** visoko ograničeni pesticidi (lista od 120 aktivnih materija);
3. **FSC Restricted HHPs:** ograničeni pesticidi (lista od 221 aktivnih materija).

Pesticidi koji se nalaze na listi FSC Prohibited HHPs zabranjeni su za primenu u FSC sertifikovanim šumama. Pesticidi koji se nalaze na FSC Highly Restricted HHPs i FSC

Restricted HHPs listi mogu se koristiti u FSC sertifikovanim šumama, ali se prioritet pre svega mora dati:

- Nehemijskim, odnosno alternativnim metodama u odnosu na pesticide;
- Pesticidima koji nisu navedeni na listama FSC Highly Restricted HHPs i FSC Restricted HHPs;
- Pesticidima koji su navedeni na listi FSC Restricted HHPs u odnosu na one koji su navedeni na FSC Highly Restricted HHPs.

U slučaju kada je aplikacija pesticida neophodna, nosilac (vlasnik) FSC sertifikata mora izvršiti procenu ekološkog i socijalnog rizika (**ESRA- Environmental and Social Risk Assessment**). Procena uzima u obzir opasnost pesticida, kao i izloženost ljudima i životnoj sredini koja proizilazi iz njegove upotrebe.

OPASNOST X IZLOŽENOST = RIZIK

Opasnost je povezana sa toksikološkim svojstvima pesticida, koja se ne mogu promeniti. Pesticidi, kao i bilo koji drugi lek, ako se zloupotrebe, mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Izloženost je način na koji se pesticidi koriste: formulacija i doziranje pesticida, upotreba lične zaštitne opreme, klimatski uslovi, oprema i lokacija, učestalost i način primene pesticida.

Rizik je interakcija između opasnosti i izloženosti. Kako bi se smanjio potencijalni rizik, pored procene toksikoloških svojstava pesticida (opasnost), neophodno je i pravilno koristiti pesticide (izloženost) u skladu sa odgovarajućom praksom primene pesticida.

Činjenica je da svi pesticidi nisu uključeni u FSC liste HHPs, ali to ne znači da su bezbedni. Prema tome, prilikom primene pesticida, uključujući i one koji se ne nalaze ni na jednoj od lista, nosioci sertifikata moraju uključiti rezultate procene ekološkog i socijalnog rizika (ESRA) u operativne planove kako bi identifikovali rizike specifične za lokalitet i prilagodili generičke mere ublažavanja i praćenja, koje su prethodno identifikovali prema uslovima na terenu.

Kada nakon procene ekološkog i socijalnog rizika (ESRA), nosilac sertifikata identifikuje i proceni rizike i dokaže da će rizici biti kontrolisani i minimizirani, može da koristi visoko ograničene i ograničene pesticide.

Strategija primene pesticida u JP „Vojvodinašume“ sprovodiće se u pravcu ostvarivanja posebnih ciljeva i to: racionalizacije primene pesticida, zaštite i očuvanja prirodnih resursa i biodiverziteta i održivog korišćenja pesticida u zaštiti šuma.

1. Racionalizacija primene pesticida

Racionalizacija primene pesticida ima višestruki značaj u šumarstvu, koji se ogleda u manjem negativnom uticaju na životnu sredinu i smanjivanju troškova zaštite šuma. U cilju racionalizacije upotrebe pesticida, primenjivaće se sledeće mere:

- Pesticidi se primenjuju u slučajevima kada je to neophodno i kada ne postoji alternativa njihovoj primeni. Ovo se odnosi na slučajeve masovne pojave štetnih organizama koji mogu da nanesu značajne štete u šumama, šumskim plantažama, semenskim objektima i rasadnicima. Primenjuju se i u slučajevima pojave lokalnih žarišta štetnih organizama i kada postoji pretnja njihovog masovnog širenja na druga područja. Blagovremenim intervencijama i suzbijanjem lokalnih žarišta štetnih organizama doprinosi se manjoj upotrebi pesticida na ograničenim površinama;
- Razvoj i uvođenje alternativnih metoda zaštite šuma od štetnih organizama vršiće se u saradnji sa naučno-istraživačkim institucijama u cilju iznalaženja odgovarajućih alternativnih preparata i metoda zaštite, kako bi se prevazišao problem isključivanja nepoželjnih pesticida;
- Odgovarajućim načinom primene (npr. primenom najnižih efikasnih doza), preventivnom i pravovremenom upotrebom i stručnim izborom odgovarajućih preparata, obezbediće se racionalizacija upotrebe pesticida, kao i redukcija tretiranih površina;
- U cilju smanjivanja primene herbicida u šumama, kao alternativa, povećavaće se relativno učešće površina sa primenom mehaničkih i mehanizovanih mera suzbijanja nepoželjne korovske drvenaste i žbunaste vegetacije.

2. Zaštita i očuvanje prirodnih resursa i biodiverziteta

Određeni doprinos zaštiti i očuvanju biodiverziteta može se dati sprovođenjem odgovarajućih mera u zaštiti šuma, kao što su:

- Smanjivanje zagađivanja životne sredine putem racionalizacije primene pesticida;
- Primena pesticida u skladu sa zahtevima FSC politike pesticida;
- Poštovanje nacionalnih i međunarodnih zakonskih propisa vezanih za primenu pesticida u zaštiti šuma;
- U skladu sa stvarnim mogućnostima, koristiće se alternativna rešenja, odnosno primena pesticida u kombinaciji sa drugim metodama. Međutim, kada je mogućnost mehaničkih mera ograničena ili se dogodi ozbiljan nedostatak radne snage, upotreba hemijskih sredstava je neophodna.

3. Održivo korišćenje pesticida u zaštiti šuma

Iznalaženje alternativnih rešenja u oblasti zaštite šuma podrazumeva intenzivnija istraživanja u ovoj oblasti i to:

- Saradnju sa zainteresovanim stranama u vezi primene pesticida u zaštiti šuma;
- Razvoj sistema integralne zaštite šuma u kojima će primarno mesto imati preventivne mere zaštite;
- Podršku naučnim institucijama u istraživanjima koja imaju za cilj iznalaženje alternativnih metoda i pesticida sa manje štetnim uticajem na životnu sredinu i biodiverzitet u šumskim ekosistemima.

U cilju sprovođenja racionalnih mera zaštite šuma, zadovoljavajuće efikasnosti i odgovarajuće kontrole primene pesticida, JP „Vojvodinašume“ ima uspostavljenu saradnju sa **Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada**, kao i povremenu saradnju sa drugim naučnim institucijama u slučajevima potrebe određene specijalističke podrške. U okviru ugovora o saradnji sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, sprovodi se monitoring zdravstvenog stanja šuma i populacionih nivoa najvažnijih bolesti i štetočina na osnovu koga se propisuje sprovođenje odgovarajućih mera zaštite. Sprovođenje propisanih mera zaštite se vrši pod nadzorom specijalista Instituta.

LISTA PREPORUČENIH PESTICIDA ZA ZAŠTITU ŠUMA SA UPUTSTVOM ZA PRIMENU

HERBICIDI

Aktivna materija (Preparati)	Spektar korova	Vreme primene	Doza ili koncentracija	Način primene	Ograničenja
Dimetenamid (FRONTIER SUPER)	Jednogodišnji travni i širokolisni korovi.	Posle setve semena šumskih vrsta, sadnje reznica topola a pre nicanja gajenih biljaka i korova.	1,4 – 1,6 l/ha	Prskanje	Manje količine preparata primenjivati na slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa), a veće na humoznim zemljištima sa preko 3% humusa. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.
Pendimetalin (STOMP, PENDISAV 330-EC i dr.)	Jednogodišnji travni i širokolisni korovi.	Posle setve semena šumskih vrsta, sadnje reznica topola a pre nicanja gajenih biljaka i korova.	4 – 6 l/ha	Prskanje	Može delovati fitotoksično ako se primeni na slabo humoznim zemljištima (< 1 %). Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.
Flumioksazin (MAX 51)	Jednogodišnji širokolisni korovi.	Posle sadnje reznica topola a pre nicanja gajenih biljaka i korova.	160 g/ha	Prskanje	Ne sme se koristiti na lakim i peskovitim zemljištima (< 1 % humusa). Može se primeniti jednom u toku vegetacije.
Glifosat (GLIFOSAV 480, TAIFUN, CLINIC TF i dr.)	Neselektivni- sistemični folijarni herbicid.	Tretiranje obaviti u fazi intenzivnog porasta korova.	2,0 – 12,0 l/ha ili 1 – 3%	Prskanje	Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno samo u sastojinama i kulturama crnog i belog bora. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Puštanje vode u kanale koji su prethodno tretirani moguće je 7 dana posle primene. Tretiranje panjeva se vrši pod

		Premazivanje panjeva obaviti posle seče stabala u periodu (maj – decembar).	10 – 15%	Premazivanje panjeva	uslovom da površine nisu izložene eroziji i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta vode. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo dva puta. Radna karenca je 6 sati.
Cikloksidim (FOCUS ULTRA)	Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	1,0 – 3,0 l/ha	Prskanje	Na istoj površini u toku godine može se primeniti jednom ili dva puta. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, ali samo kada su u pitanju dikotiledone gajene biljke.
Fluazifop-p-butil (FUSILADE FORTE, NEPTUNE 15-EC)	Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	0,8 – 1,3 l/ha	Prskanje	Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti jednom ili dva puta.
Propakvizafop (AGIL 100-EC)	Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	0,8 – 1 l/ha	Prskanje	Može delovati fitotoksično ukoliko se primeni na temperaturama većim od 25 °C. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti jednom ili dva puta u dvokratnoj primeni.
Kvizalofop-P-tefurila (PANTERA 40-EC, TITANIK) Kvizalofop-P-etila (LEOPARD 5-EC, GLOBUS EC)	Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	0,8 – 2 l/ha 0,5 – 4 l/ha	Prskanje	Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti jednom ili dva puta u dvokratnoj primeni.

Kletodim (SELECT SUPER, RONIN)	Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	0,8 – 2 l/ha	Prskanje	Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova.
Nikosulfuron (MOTIVELL, NICOGAN)	Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	1,0 – 1,2 l/ha	Prskanje	Na istoj površini u toku godine može se primeniti jednom ili dva puta u dvokratnoj primeni.
Fluroksipir (STARANE -250, BONACA EC, TOMIGAN)	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	0,8 – 2,0 l/ha	Prskanje	Ne sme se primenjivati na slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima zbog isparljivosti. Na istoj površini u toku godine može se primeniti jednom.
Imazamoks (KVAZAR, IKARUS, IKARUS 40 SL, IMAZAR 40)	Jednogodišnji i višegodišnje širokolisne i neke uskolisne.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	1 – 1,2 l/ha	Prskanje	Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.
Klopivalid (LONTREL 100, PIRALIS 100) Klopivalid (LONTREL 300, LORET, PIKOGAL PLUS)	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.	Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.	1 l/ha 0,3 – 0,4 l/ha	Prskanje	Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.

FUNGICIDI

Aktivna materija (Preparati)	Prouzrokovatelj bolesti	Vreme primene	Doza ili koncentracija	Način primene	Ograničenja
Folpet (FOLPAN WP-50)	Za suzbijanje prouzrokovatelja lisnih oboljenja.	Preventivno pre ostvarivanja infekcije.	0,2 – 0,25%	Prskanje	Ne sme se mešati sa preparatima kisele reakcije. Na istoj površini u toku godine može se primeniti četiri puta. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Azoksistrobin (QUADRI, QUEEN, AZAKA 250SC, PROMESA)	Za suzbijanje prouzrokovatelja lisnih oboljenja <i>Marssonina</i> <i>brunea</i> i dr.	Preventivno kao i pri pojavi prvih simptoma oboljenja.	0,075% ili 0,75 l/ha	Prskanje	Na istoj površini u toku godine može se primeniti tri puta.
Tebukonazol (AKORD)	Za suzbijanje: - pepelnice - rđe	Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.	0,5 %	Prskanje	Na istoj površini u toku vegetacije može se primeniti 3 puta. Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je samo u usevu šećerne repe.
Mefentriflukonazol (REYONA)	Za suzbijanje: - pepelnice	Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.	2 l/ha		Ovaj fungicid je kompatibilan sa insekticidima i drugim fungicidima, kao i sa folijarnim đubrivima. Međutim, pre primene mešavine izvršiti test kompatibilnosti na manjoj površini.

Difenokonazol (SCORE 250 EC)	Za suzbijanje: - crne pegavosti (<i>Alternaria</i> spp.) - čađave pegavosti (<i>Venturia</i> spp.)	Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.	0,2 – 0,5 l/ha	Prskanje	Na istoj površini u toku vegetacije može se primeniti 3 puta. Razmak između tretiranja je 8 - 14 dana.
Penkonazol (TOPAS 100-EC)	Za suzbijanje pepelnice.	Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.	0,025%	Prskanje	Na istoj površini u toku vegetacije može se primeniti 3 puta (u intervalima 10 – 14 dana).
Trifloksistrobin (ZATO 50-WG, BELATRIX)	Za suzbijanje pepelnice.	Fungicid sa protektivnim i specifičnim kurativnim delovanjem.	150 gr/ha	Prskanje	Na istoj površini u toku vegetacije može se primeniti 4 puta. Može se mešati sa insekticidima i fungicidima neutralne reakcije.
Fosetil-aluminijum (ALIETTE FLASH, TOPIC i dr.)	Za suzbijanje prouzrokovaca lisnih oboljenja <i>Marssonina</i> <i>brunea</i> , plamenjača i <i>Phytophthora</i> .	Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.	0,25 – 0,37 %	Prskanje	Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu biljaka. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti dva do tri puta.
Bakar-oksihlorid (BAKARNI OKSIHLORID-50 CUPROCAFFARO 50)	Za suzbijanje: - smeđe pegavosti lišća topola (<i>Marssonina</i> <i>brunea</i>).	Fungicid sa protektivnim delovanjem.	BAKARNI OKSIHLORID-50 0,5 %		Ne sme se mešati sa preparatima jako kisele reakcije. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti dva puta. Može delovati fitotoksično ukoliko se primeni u uslovima

WP NEORAM 37,5 WG)	- prouzrokovavača rđe na topolama (<i>Melampsora</i> sp.) - crvene prstenaste pegavosti četina bora (<i>Dothistroma pini</i>) - odumiranje jasena 'die-back' (<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>).		CUPROCAFF ARO 50 WP 0,5 % NEORAM 37,5 WG 0,3 %	Prskanje	hladnog i vlažnog vremena.
Propamokarb hidrohlid (PREVICUR 607-SL, BEVICUR-N)	Za suzbijanje velikog broja prouzrokovavača bolesti i protiv poleganja rasada (<i>Pythium</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Peronospora</i> , <i>Pseudoperonospo ra</i> i dr.).	Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.	0,15 – 0,3%	Prskanje, Zalivanje, Potapanje	Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti jedan do četiri puta.
Bupirimat (NIMORD)	Za suzbijanje pepelnice.	Sistemik sa protektivnim i kurativnim delovanjem.	0,04 – 0,06%	Prskanje	Ne sme se mešati sa alkalnim preparatima.

Fludioksonil (MAXIM 025-FS)	Za tretiranje hrastovog žira nakon termoterapije a pre skladištenja.	Nesistemični preventivni fungicid.	0,3-0,5 l/100 kg semena uz dodatak 0,5 l vode.	Tretiranje u odgovarajući m uređajima koji obezbeđuju intenzivno mešanje.	Tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja. Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena, sprečiti kontaminaciju voda.
---------------------------------------	--	--	---	---	---

INSEKTICIDI

Aktivna materija (Preparati)	Štetni organizmi	Mehanizam i način delovanja	Doza ili koncentracija	Način primene	Ograničenja
Acetamiprid (MOSPILAN 20-SG, VOLLEY 20-SP, WIZZZAARD)	Za suzbijanje: - Bube listare (<i>Chrysomela populi</i>) - Lisnih vaši - Bele leptiraste vaši - Tripsa - Lisnih minera	Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.	0,02 – 0,025%	Prskanje	Zbog mogućnosti razvoja rezistentnosti i ukrštene rezistentnosti ne sme se primenjivati alternativno sa preparatima na bazi drugih neonikotinoidea.
Piriproksifen (HARPUN, ALKAZAR)	- Bele leptiraste vaši - Lisnih minera	Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Poseduje i ovicidno delovanje.	0,05 – 0,075 %	Prskanje	Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti populacije štetnih insekata na piriproksifen, preparat ne primenjivati više od dva puta tokom vegetacione sezone.
Bifenazat (SANTOS, MAFENTE)	- Grinje	Nesistemični akaricid sa kontaktnim delovanjem. Grinje vrlo brzo nakon primene prestaju sa ishranom, ugibaju nakon 3- 4 dana.	0,75 – 1 l/ha	Prskanje	Nema štetnog delovanja na predatore i oprašivače i nema fitotoksičnosti , čak i kod povišenih doza primene.

Hlorantraniliprol (CORAGEN 20 SC)	Za suzbijanje: - bube listare (<i>Chrysomela populi</i>) - Lisnih minera - Sovica	Ograničeni sistemik sa izraženim translaminarnim kretanjem. Deluje digestivno ali i kontaktno. Posедуje dobro ovicidno delovanje.	0,015 – 0,02%	Prskanje	Primena preparata na bazi hlorantraniliprol nije dozvoljena iz vazduhoplova izuzev u usevu kukuruza. Maksimalan broj tretiranja tokom vegetacione sezone je dva puta.
Flonikamid (TEPPEKI, TALENT)	Za suzbijanje: - Lisnih vaši - Bele leptiraste vaši - Tripsi	Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.	0,08 – 0,14 kg/ha uz utrošak vode 1000 l	Prskanje	Može se mešati sa nekim fungicidima kao što je kresoksim-metil i fungicid na bazi sumpora.
Tau-fluvalinat (MAVRIK)	Za suzbijanje: -Lisnih vaši - Tripsa - <i>Phyllobius</i> sp. i <i>Polidrosus</i> sp.	Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.	0,03% 0,15 l/ha 0,15 – 0,2 l/ha	Prskanje	Preparat ne primenjivati više od dva puta tokom vegetacione sezone.
Spinosad (LASER 240-SC)	Za suzbijanje: -Gubara (<i>Lymantria dispar</i>)	Spinosad je biopesticid, ograničeni sistemik sa umerenim	0,1 l/ha + 1,5 l/ha belog ulja + 1,4 l/ha vode 50 – 100 ml/ha	Mikroniranje Prskanje	Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno u šumama, pod sledećim uslovima: Površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda 8vodotoka,

	-Bube listare (<i>Chrysomela populi</i>) -Tripsa	translaminarnim kretanjem. Deluje kontaktno i digestivno na insekte.	300 – 400 ml/ha	Prskanje	jezera, bunari, izvorišta...), brzina vetra ne sme prelaziti 2 m/s, a rubne zone (200 – 500 m) se tretiraju sa zemlje.
Buprofezin (ELISA)	Za suzbijanje: -Bele leptiraste vaši -Štitastih vaši -Cikada i grinja	Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.	0,025 – 0,05% 0,05%+ 0,15% okvašivača Nu-film 0,06%	Prskanje	Maksimalan broj tretiranja tokom vegetacione sezone je četiri puta godišnje.
Bacillus thurigiensis var. Kurstaki (FORAY 48 B, WORMOX OF)	Za suzbijanje: -Gubara (<i>Lymantria dispar</i>)	Bakterijski biopesticid sa digestivnim delovanjem.	Foray 48 B 3 l/ha Wormox OF 1 – 1,5 l/ha	Mikroniranje	Tretiranje iz vazduhoplova (Wormox OF) dozvoljeno je pod sledećim uslovima: Površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata a najmanje 200 m od vodo zaštitnih zona i voda. Brzina vetra ne sme da bude veća od 2-3 m/s a rubne zone (200 – 500 m) se tretiraju sa zemlje.
Teflutrin (FORCE 1,5 G)	Za suzbijanje: Larvi žičnjaka (<i>Elateridae</i>) i larvi gundelja – grčica (<i>Melolonthinae</i>).	Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem.	Force 1,5 G 5 kg/ha	Rasturanje granula u vreme setve ili sadnje	Na tretiranim površinama ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, najmanje 28 dana od dana primene. Štetan je za ptice, pčele, za živi svet u vodi. Toksičan je ako se udiše, proguta ili dođe u kontakt sa kožom.

Dazomet (BASAMID GRANULAT)	Neselektivni zemljišni fumigant za suzbijanje larvi žičnjaka (<i>Elateridae</i>) i larvi sovice (<i>Agrotis</i> spp.) Pored insekticidnog posедуje nematocidno, fungicidno i herbicidno delovanje.	Zemljišni pesticid koji se razgrađuje do metil- izotijacijanata (MITC), gasa koji toksično deluje na žive organizme.	30 – 60 g/m ³	Inkorporacija granula na dubinu 15 – 25 cm dubine. Nakon inkorporacije granula, zemljište se prekriva plastičnom folijom. Posle ekspozicije, plastična folija se uklanja a zemljište obrađuje na dubini na kojoj je vršena inkorporacija granula.	Kod primene u zaštićenom prostoru tretiranje se ne sme izvoditi ukoliko se u drugom delu nalaze gajene biljke. Tretiranje se mora izvesti najmanje 45 dana pre setve. Mikrogranule se ne smeju ostavljati na površini – moraju se inkorporirati. Posle primene u zaštićenom prostoru obavezno je provetravanje. Temperatura zemljišta koje se tretira ne sme biti niža od 10 °C. Broj dozvoljenih tretmana jedan.
Mineralna ulja sa manje od 3% dimetil-sulfoksida (GLALMIN CRVENO ULJE PLAVO ULJE)	Za suzbijanje prizemljujući formi insekata.	Deluju tako što fizički sprečavaju razmenu gasova kod tretiranih insekata i grinja ("gušenje").	GALMIN 1% - 2% CRVENO ULJE 2 - 3 % PLAVO ULJE 3 %	Prskanje	Optimalno vreme za zimsko prskanje drveća i žbunja je kraj februara. To je zapravo vreme neposredno pred početak vegetacije. Smatra se da su prvi dana marta, odnosno faza razvoja cvetova ili lisnih pupoljaka poznatija kao fenofaza "mišije uši" poslednji rok kada treba obaviti zimsko prskanje. Tretiranje treba obaviti po lepom vremenu, bez vetra, kada su stabla suva a temperatura vazduha iznad 8 – 10 °C da bi se izbeglo izmrzavanje. Temperatura prilikom prskanja treba da bude iznad 8 °C jer se mineralna ulja "ne lepe" za tretiranu površinu ako je temperatura niža od 8 °C.

RODENTICIDI

Aktivna materija (Preparati)	Štetni organizmi	Mehanizam i način delovanja	Doza ili koncentracija	Način primene	Ograničenja
Zink-fosfid (CINKOSAN, AGROCINKAN)	Za suzbijanje miševa, poljskih miševa, voluharica, pacova.	Akutni rodenticid. Respiratorni otrov. Nakon ingestije (unošenja u organizam) u kontakta sa pljuvačnom i želudačnom kiselinom, oslobađa se toksični gas fosfin koji prekida ćelijsko disanje i izaziva uginuće glodara.	5 – 10 gr/rupi	Postavljanjem mamaka u aktivne rupe	Na tretiranim površinama, najmanje 14 dana posle primene, ne dozvoliti pristup domaćim životinjama. Ne sme se koristiti u stambenim objektima, po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. Veoma je toksičan za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Veoma je toksičan za ptice.

DIREKTOR PREDUZEĆA

Roland Kokai, mast. ek.